

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ GRIPPALE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Période du rapport : du 24 août au 6 septembre 2014 (semaines 35 et 36)

Sommaire

Au Nouveau-Brunswick, l'activité grippale reste à un niveau inter-saisonnier

Nouveau- Brunswick:

- Il n'y a eu aucune détection positive de la grippe durant les semaines 35 et 36.
- Le taux de consultations pour le syndrome grippal était de 6.1 et 0.0 consultations sur 1000 visites, pour les semaines 35 et 36, respectivement, et se situait dans les taux prévus pour les 2 semaines.
- Aucune éclosion de grippe ou de syndrome grippal n'a été signalée.

Canada:

- Au cours des semaines 35 et 36, l'activité grippale au Canada est restée à des niveaux intersaisonniers avec seulement des détections sporadiques de la grippe. Le nombre de détections de la plupart des autres virus respiratoires était à un niveau intersaisonnier.
- 9 détections positives de la grippe ont été signalées durant les semaines 35 et 36 et la proportion des tests positifs pour l'influenza était de moins de 1% durant les 2 semaines.
- Le taux de consultations pour le syndrome grippal était de 13,6 et 12,3 consultations sur 1000 visites, pour les semaines 35 et 36, respectivement. Le taux pour les 2 semaines était au-dessus des taux prévus pour ce temps de l'année.
- Aucune nouvelle éclosion de grippe n'a été signalée durant les 2 semaines.
- Caractérisation des souches grippales : Le laboratoire national de microbiologie n'a pas encore signalé la caractérisation des souches de virus grippaux de la saison 2014-2015.

International :

- Globalement, la saison de la grippe est en cours dans l'hémisphère sud. Ailleurs, l'activité grippale est restée faible, sauf pour certains pays tropicaux dans les Amériques.
- Infection humaine avec une grippe aviaire : En date du 11 septembre 2014, un total de 453 cas confirmés d'infection humaine par un virus de la grippe aviaire A(H7N9) a été rapporté en Chine (également au Taiwan, à Hong Kong et en Malaisie) dont 175 décès. La plupart des cas ont été atteints de maladie aiguë grave, progressant rapidement à une pneumonie grave. La plupart des cas humains ont signalé une exposition à des volailles ou des marchés de volailles vivantes. Il n'y a aucune preuve de transmission humaine continue.
- Nouveau virus de la grippe A : Un total de 2 cas de H3N2v ont été signalés jusqu'à maintenant en 2014 aux États-Unis.
- Autres virus respiratoires :
- MERS-CoV : D'avril 2012 au 11 septembre 2014, 841 infections humaines par le virus MERS-CoV ont été signalées dans 21 pays. Tous les cas ont eu lieu soit au Moyen-Orient ou ont un lien direct avec un cas primaire infecté au Moyen-Orient. Parmi les 841 cas, 298 cas étaient mortels. L'enquête se poursuit afin d'identifier la source d'infection et les voies d'exposition.
- EV-D68 : De la mi-août au 24 septembre 2014, aux États-Unis, un total de 220 personnes dans 32 états ont été confirmés d'avoir une maladie respiratoire causée par l'entérovirus D68. Jusqu'à maintenant tous les cas ont été chez des enfants excepté un adulte. EV-D68 n'est pas une maladie à déclaration obligatoire au Canada et les tests de laboratoire pour ce virus ne sont pas systématiquement effectués (mais sont disponibles sur demande). Conséquemment, les cas sont probablement sous-détectés et sous-déclarés.


À noter: Ceci est le premier rapport de la saison grippale 2014-2015. Les rapports seront publiés aux deux semaines jusqu'au 10 octobre 2014.

1) Données provenant du laboratoire¹

- L'activité grippale reste à un niveau inter-saisonnier.
- Aucune détection positive de la grippe n'a été signalée au cours de cette période de 2 semaines.
- Depuis le début de la saison, aucune détection positive de la grippe n'a été signalée.

¹ Les échantillons de surveillance sont soumis par les praticiens recrutés par le Réseau des praticiens sentinelles de l'influenza du Nouveau-Brunswick (RPSI-NB). Ce réseau est composé de 8 sites en salles d'urgence, 2 sites en médecine familiale, 2 sites en Premières Nations, 1 site dans un foyer de soins, 2 sites dans les universités, et 8 sites dans les centres de santé communautaire. Les spécimens diagnostiques sont soumis par les médecins en milieu hospitalier et communautaire. Les données de laboratoire relatives à l'influenza comprennent les résultats provenant de spécimens diagnostiques ainsi que de surveillance. Tous les échantillons sont analysés au moyen d'une épreuve de PCR, qui consiste en une méthode rapide de détection conçue pour la détection de toutes les variantes connues de l'influenza A et B. Tous les cas confirmés en laboratoire sont signalés pour la semaine durant laquelle la confirmation du laboratoire est obtenue.

Figure 1 : Nombre et pourcentage de spécimens positifs de grippe au Nouveau-Brunswick par semaine, jusqu'au 6 septembre 2014 (source des données : résultats du laboratoire Georges-Dumont).



Note: Influenza A (non sous-typés et autres) peut inclure des spécimens (H1N1)pdm09 et H3N2 qui n'ont pas été sous-typés.

Tableau 1 : Résultats de tests positifs d'influenza, par région sanitaire, au Nouveau-Brunswick, pour la semaine de rapport, cumulatif pour la saison courante et la saison précédente. (source des données : résultats du laboratoire G. Dumont jusqu'au 6 septembre 2014)


Région	Période du rapport: août/24/2014–septembre/06/2014						Cumulatif: (saison 2014-2015) août/24/2014 –septembre/06/2014					Cumulatif: (saison 2013-2014) août/25/2013 – août/23/2014				
	Niveau d'activité grippale ²	A			B	Total	A			B	Total	A			B	Total
		A(H3)	(H1N1) pdm09	Non sous- typé/ Autres			A(H3)	(H1N1) pdm09	Non sous- typé/ Autres			A(H3)	(H1N1) pdm09	Non sous- typé/ Autres		
Région 1	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	205	442	39	688
Région 2	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	219	2	307
Région 3	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	80	4	125
Région 4	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	61	49	162
Région 5	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	23	6	39
Région 6	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	49	25	116
Région 7	Aucune activité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	3	18
Total N.-B.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	440	885	128	1455

² Définition des niveaux d'activité grippale: <http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/14-15/def14-15-fra.php>

2) Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG)³

- Au cours des semaines 35 et 36, le taux de consultations pour le syndrome grippal était 6,1 et 0,0 consultations par 1,000 visites, respectivement, et se situait dans les taux prévus pour les 2 semaines.
- Au cours des semaines 35 et 36, le taux de participation des sentinelles était de 22% et 31%, respectivement, pour les médecins contribuant au programme national de surveillance de l'influenza « FluWatch » et pour le réseau des praticiens sentinelles de l'influenza du Nouveau-Brunswick (RPSI-NB).

Figure 2 : Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG) au Nouveau-Brunswick, par semaine de déclaration, saison 2014/15 comparée aux saisons précédentes*.



* Le taux moyen fut calculé à partir des données des saisons 1996/97 à 2013/14 et excluant la saison pandémique (2009-2010).

³ Un total de 31 sites de praticiens (18 médecins contribuant au programme national de surveillance de l'influenza « FluWatch » et 13 sites provenant du RPSI-NB) ont été recrutés pour la saison 2014/2015 afin de signaler le nombre de patients présentant un SG par rapport au nombre total de consultations de patients durant une journée, et ce, une fois par semaine.

3) Syndrôme grippal (SG) et données relatives aux éclosions confirmées par le laboratoire :


Tableau 2 : Activité grippale/éclosions dans les foyers de soins et écoles du Nouveau-Brunswick pour la période du rapport, pour la saison courante et la saison précédente.

	Période du rapport: août/24/2014–septembre/06/2014			Nombre cumulatif d'éclosions saison 2014-2015	Nombre cumulatif d'éclosions saison 2013-2014
	Nombre d'éclosions confirmées en laboratoire dans les foyers de soins*	Écoles signalant des éclosions de SG**	Nombre d'éclosions confirmées en laboratoire dans d'autres établissements*		
Région 1	0 sur 13	0 sur 74	0	0	3
Région 2	0 sur 15	0 sur 81	0	0	2
Région 3	0 sur 14	0 sur 95	0	0	4
Région 4	0 sur 6	0 sur 22	0	0	1
Région 5	0 sur 2	0 sur 18	0	0	0
Région 6	0 sur 9	0 sur 35	0	0	3
Région 7	0 sur 4	0 sur 27	0	0	2
Total N.-B.	0 sur 63	0 sur 352	0	0	15

*Au moins deux cas de SG en sept jours et au moins un cas d'influenza confirmé en laboratoire. Les éclosions sont signalées pour la semaine où l'on obtient une confirmation par le laboratoire.

**Un taux d'absentéisme de plus de 10 % et ce, apparemment attribuable au SG.

Figure 3 : Nombre d'éclosions de grippe (foyers de soins, hôpitaux et autres établissements) et d'éclosions de syndrome grippal (écoles) déclarées à la Santé publique au Nouveau-Brunswick, par semaine de rapport, saison 2014/15.



Programme national de surveillance de l'influenza (FluWatch) – Pour un complément d'information sur l'activité grippale au Canada et dans le monde, consultez le site Web de l'Agence de santé publique du Canada à : <http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php>

Autres liens :

Mondial: http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/index.html

Europe: http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.aspx

PAHO: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569

Australie: <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm>

Nouvelle- Zélande: http://www.surv.esr.cri.nz/virology/influenza_weekly_update.php

Argentine: <http://www.msal.gov.ar/>

Afrique du sud: <http://www.nicd.ac.za/>

États-Unis: www.cdc.gov/flu/weekly/

Préparé par l'Unité de contrôle des maladies transmissibles
Bureau du médecin hygiéniste en chef, tél. : 506-444-3044