

ESPÈCES EN PÉRIL

au Nouveau-Brunswick



Pygarge à tête blanche

Nom scientifique: *Haliaeetus leucocephalus*

Situation au N.-B.: Régionales Menacées

Pygarge à tête blanche

Description & biologie

Le pygarge à tête blanche est un oiseau de proie distinctif et on le reconnaît facilement par sa tête et sa queue à plumes blanches, et à ses pattes et à son bec jaunes. L'oiseau acquiert ce plumage unique seulement à l'âge adulte, soit vers quatre ou cinq ans. Les juvéniles sont entièrement bruns pendant les deux premières années de leur vie, après quoi ils commencent à arborer des plumes blanches.

Le pygarge à tête blanche a des serres fortes et acérées dont il se sert pour capturer ses proies. Il possède également un grand bec crochu qu'il utilise pour tuer sa proie et la déchirer en pièces. Le pygarge peut capturer de gros poissons vivants, mais il se nourrit aussi de charogne, surtout en hiver. La sauvagine et les petits mammifères font aussi partie de son alimentation.

Au Nouveau-Brunswick, le pygarge à tête blanche retourne aux aires de nidification à partir du mi-février. L'accouplement se fait en avril ou durant les premières semaines de mai. Toute perturbation durant cette période de nidification et d'accouplement peut amener

le couple à abandonner le nid. Les jeunes auront normalement quitté le nid à la fin d'août.

Habitat & survie

Le pygarge à tête blanche construit son nid de branches et de matériaux végétaux sur la cime des grands arbres; la plupart du temps il s'agit de grands pins blancs. Cet oiseau de proie bâtit le plus grand nid d'oiseau qui soit en Amérique du Nord : il peut atteindre 2 m de diamètre. Le nid sert souvent pendant un certain nombre d'années avant d'être abandonné. Pendant la saison de reproduction, le pygarge à tête blanche peut défendre avec beaucoup d'ardeur son territoire, qui peut couvrir un rayon de 2 km autour du nid.

L'oiseau construit habituellement son nid près d'une grande étendue d'eau, où le poisson abonde. Au Nouveau-Brunswick, certaines de nos îles côtières offrent un habitat convenable au pygarge et il n'est donc pas rare d'y observer des aigles qui y établissent leurs nids.


Pendant l'hiver, les pygarges sont plus fréquemment observés dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, où ils peuvent trouver davantage de nourriture, ce qui s'explique surtout par le fait que la baie de Fundy ne gèle pas durant la saison froide.

Une bonne mesure de protection de l'espèce consiste à limiter les modifications de l'environnement, ainsi que les perturbations, à proximité de ces lieux de nidification.

Aire de répartition

Il existe deux populations distinctes de pygarge à tête blanche au Nouveau-Brunswick : une habite la province en permanence et y passe l'hiver, tandis que la deuxième population migre chaque année à destination et en provenance du sud-est des États-Unis. Même si le pygarge à tête blanche peut être observé dans toutes les régions de la province, il est plus commun dans le sud-ouest, où les grandes étendues d'eau sont plus fréquentes.

Le pygarge à tête blanche est présent dans toutes les régions du Canada, sauf dans les Prairies et l'Arctique, et son aire de répartition atteint le Mexique. La plus grande concentration de pygarges à tête blanche dans l'Est de l'Amérique du Nord se trouve au Cap-Breton.



Aire de répartition au N-B du Pygarge à tête blanche